

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT HPV?

Najlepiej zacząć od lekarza rodzinnego lub dentysty – skonsultuj się z nimi jeśli niepokoją Cię objawy. Wiele przydatnych informacji możesz znaleźć na stronie internetowej www.makesensecampaign.eu

Jeśli wystąpi u Ciebie **JEDEN** z poniższych objawów przez co najmniej **TRZY** tygodnie, zgłoś się do lekarza!



Niegojące się owrzodzenie, biały lub czerwony nalot w jamie ustnej



Ból gardła



Chrypka



Ból podczas polykania lub trudności z polykaniem



Guz na szyi



Jednostronna niedrożność nosa lub krwista wydzielina z nosa



11 lat
Profilaktyki
Nowotworów
Głowy i Szyi
w Polsce

Patronat merytoryczny:
prof. zw. dr hab. n. med. Wojciech Golusiński

INWAZJA NOWOTWORÓW GŁOWY I SZYI RATUJ ŻYCIE

ZROZUMIEĆ WIRUSA
BRODAWCZAKA LUDZKIEGO
HPV

Co roku diagnozowanych jest około 560 tysięcy nowych przypadków nowotworów złośliwych głowy i szyi, a występowanie nowotworów związanych z infekcją wirusem HPV ciągle wzrasta.

Organizatorzy:

Sponsorzy:



Organizatorzy:



CZYM JEST WIRUS HPV?


Pod pojęciem wirusa brodawczaka ludzkiego HPV mieści się grupa powszechnie spotykanych wirusów wnikających do skóry oraz błony śluzowej (m.in. okolic jamy ustnej, gardła i narządów płciowych). Występuje ponad 100 typów wirusa HPV, a dla większości osób infekcje są przemijające. Czasami wirus może pozostać nieaktywny u zakażonej osoby przez miesiące.

CO ŁĄCZY WIRUSA HPV I NOWOTWORY GŁOWY I SZYI?

Niektóre typy wirusa HPV (znane jako typy wysokiego ryzyka) predysponują do powstania niektórych nowotworów złośliwych, w tym nowotworów głowy i szyi.

KOGO DOTYCZY WIRUS HPV?

Infekcja wirusem HPV występuje powszechnie i jest łatwo przekazywana podczas stosunku seksualnego (zarówno waginalnego, analnego, jak i oralnego). Nawet jeśli posiadałeś/aś tylko jednego partnera, ciągle możesz zarazić się wirusem HPV. Osoba zakażona może nie mieć żadnych objawów.



W niektórych rejonach świata ponad połowa nowotworów złośliwych tych okolic ma związek z infekcją wirusem HPV. Chorzy z HPV-zależnym nowotworem głowy i szyi są zazwyczaj młodszy, w dobrym stanie ogólnym, niepalący i niepijący alkoholu.



CZY MOŻNA ZAPOBIEC INFEKCJI WIRUSEM HPV?

Obecnie dostępne są trzy szczepionki, które zapobiegają infekcji wirusem HPV. Szczepionki zapewniają skuteczną ochronę przeciwko niektórym typom wirusa. Nie leczą natomiast toczących się już infekcji, ani choroby wywołanej wirusem HPV. Szczepionki te pozwalają chronić się również przed infekcjami HPV w obrębie gardła oraz związanymi z nimi nowotworami głowy i szyi. Niektóre kraje wprowadziły rutynowe programy szczepień przeciwko HPV. Porozmawiaj ze swoim lekarzem, by dowiedzieć się więcej na temat dostępności szczepionek w Polsce.



CZY MOŻNA WYKRYĆ INFEKCJĘ WIRUSEM HPV?

Infekcja wirusem HPV przebiega bezobjawowo, dlatego wirus może nie zostać wykryty. Przesiewowe badanie na obecność wirusa HPV jest podstawą badań profilaktycznych w kierunku raka szyjki macicy. Nie ma natomiast przesiewowych badań pozwalających wykryć infekcję HPV powodującą nowotwory złośliwe głowy i szyi. Nowotwór złośliwy głowy i szyi może zostać wykryty podczas badania przez lekarza rodzinnego lub dentystę.

CO MOGĘ ZROBIĆ W ZWIĄZKU Z HPV-ZALEŻNYM NOWOTWOREM GŁOWY I SZYI?

Nowotwory wywołane przez infekcję wirusem HPV można leczyć skuteczniej, gdy są wcześniej wykryte. Warto znać zatem ich pierwsze objawy. Jeśli doświadczasz objawów związanych z nowotworem głowy i szyi, dostępnych może być kilka metod leczenia w zależności od lokalizacji i zaawansowania nowotworu. Twój lekarz omówi je z Tobą i pozwoli wybrać najlepszą metodę dla Ciebie.

Objawy to: niegojące się owrzodzenie, albo biały lub czerwony nalot w jamie ustnej, ból gardła, chrypka, ból podczas połykania lub trudności z połykaniem, guz na szyi, jednostronna niedrożność nosa lub krwista wydzielina z nosa

Jeśli obawiasz się nowotworu głowy i szyi, skonsultuj się z lekarzem rodzinnym lub dentystą.